


定期予防接種スケジュール



ワクチンの種類	対象年齢	回数	標準的な接種間隔	ワクチンの種類	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
ロタリックス® (2回接種)	生後6週0日から 生後24週0日まで	2回	1回目は生後14週6日までに接種し、27日以上の間隔で2回目を接種	水痘 (みずぼうそう)	1歳~3歳未満	2回	6~12か月の間隔で接種
ロタテック® (3回接種)	生後6週0日から 生後32週0日まで	3回	1回目は生後14週6日までに接種し、27日以上の間隔で2~3回目を接種	日本脳炎	【1期】 生後6か月~7歳未満	初回2回	6~28日(1~4週)の間隔で接種
B型肝炎	1歳未満	3回	27日(4週)以上の間隔で、2回接種した後、1回目から20週以上の間隔で、3回目を接種			追加1回	初回2回終了後、おおむね1年の間隔で接種
小児用肺炎球菌	生後2か月~5歳未満	初回3回 追加1回	27日(4週)以上の間隔で、1歳までに接種 初回3回終了後、60日以上の間隔で、1歳~1歳3か月の間に接種	DT (ジフテリア・破傷風・混合ワクチン)	【2期】9歳~13歳未満	1回	-
5種混合(DPT-IPV-Hib) (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ混合ワクチン)	生後2か月~7歳未満	初回3回 追加1回	20~56日(3~8週)の間隔で接種 初回3回終了後、6~18か月の間隔で接種	子宮頸がん (サーバリックス®) ※女子のみ対象	小6から高1相当の女子	3回	1か月の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて、1回接種
BCG	生後3か月~1歳未満	1回	-	子宮頸がん (ガーダシル®) ※女子のみ対象	小6から15歳までの女子	2回	2か月の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて、1回接種
MR (麻疹風しん)	【1期】1歳~2歳未満 【2期】5歳~7歳未満で、 小学校入学前の1年間	1回 1回	-	子宮頸がん (シルガード®9) ※女子のみ対象	15歳から高1相当の女子	3回	2か月の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて、1回接種

【問合せ先】
 高槻市子ども未来部子ども保健課
 (高槻市子ども未来館2F)
 〒569-0096
 高槻市八丁畷町12番5号
 TEL : 072-648-3272

(注3) サーバリックス®, ガーダシル®, シルガード®9いずれかの接種となります。原則として、同じワクチンで完了させてください。

(注4) シルガード®9の1回目を15歳以上で接種した場合は3回接種(ガーダシル®と同じ接種感覚)が必要になります。

異なるワクチンを接種する際の接種間隔
 接種日の翌日から数えて

注射生ワクチン → 27日以上 → 注射生ワクチン

経口生ワクチン → 接種間隔に制限はありません → 経口生ワクチン

不活化ワクチン → 接種間隔に制限はありません → 不活化ワクチン

(注) 小児用肺炎球菌は、生後7か月を過ぎてから接種を開始した場合、接種回数が通常(*)と異なります。詳しくは『予防接種と子どもの健康』をご覧ください。子ども保健課までお問合せください。※生後2か月~7か月未満に接種を開始し、初回3回+追加1回の合計4回を接種するのが通常です。

(注1) ロタリックス®(2回接種)かロタテック®(3回接種)いずれか一方の接種となります。また、途中でワクチンの変更はできませんのでご注意ください。

生後24週0日までに合計2回接種(注1)

生後32週0日までに合計3回接種(注1)

ロタリックス、ロタテックいずれの場合も初回接種は生後14週6日までの接種が推奨されています

初回3回終了後、60日以上の間隔で1歳~1歳3か月の間に接種

6~18か月(6か月あければ接種は可)

【1期】1歳になったらすぐに接種

【2期】小学校入学前の1年間

異なるワクチンを接種する際の接種間隔
 接種日の翌日から数えて

注射生ワクチン → 27日以上 → 注射生ワクチン

経口生ワクチン → 接種間隔に制限はありません → 経口生ワクチン

不活化ワクチン → 接種間隔に制限はありません → 不活化ワクチン

【1期】初回① 6~28日 追加② 1年(6か月あければ接種は可)

3回接種(注3) ①1か月 ② 1回目から6か月

3回接種(注3) ①2か月 ② 1回目から6か月

2回接種(注3.4) ① 1回目から6か月