


# 定期予防接種スケジュール

標準的な接種時期 定期予防接種の対象となる年齢 接種間隔 令和7年3月 高槻市作成



ワクチンの種類	対象年齢	回数	標準的な接種期間・間隔	ワクチンの種類	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
ロタリックス® (2回接種)	生後6週0日から 生後24週0日まで	2回	1回目は生後14週6日までに接種し、27日以上の間隔で2回目を接種	水痘 (みずぼうそう)	1歳~3歳未満	2回	6~12か月の間隔で接種
ロタテック® (3回接種)	生後6週0日から 生後32週0日まで	3回	1回目は生後14週6日までに接種し、27日以上の間隔で2~3回目を接種		【1期】 生後6か月~7歳未満	初回2回	6~28日(1~4週)の間隔で接種
B型肝炎	1歳未満	3回	27日(4週)以上の間隔で、2回接種した後、1回目から20週以上の間隔で、3回目を接種	【2期】9歳~13歳未満		追加1回	初回2回終了後、おおむね1年の間隔で接種
小児用肺炎球菌	生後2か月~5歳未満	初回3回 追加1回	27日(4週)以上の間隔で、1歳までに接種 初回3回終了後、60日以上の間隔で、1歳~1歳3か月の間に接種	DT (ジフテリア・破傷風・混合ワクチン)	11歳~13歳未満	1回	-
5種混合(DPT-IPV-Hib) (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ混合ワクチン)	生後2か月~7歳未満	初回3回 追加1回	20~56日(4~8週)の間隔で接種 初回3回終了後、6~18か月の間隔で接種	子宮頸がん (サーバリックス®)	小6から高1相当の女子	3回	1か月の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて、1回接種
BCG	1歳未満	1回	-	子宮頸がん (サーバリックス®)	小6から高15歳までの女子	2回	2か月の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて、1回接種
MR (麻しん風しん)	【1期】1歳~2歳未満 【2期】5歳~7歳未満で、 小学校入学前の1年間	1回 1回	- -	子宮頸がん (シルガード®9)	小6から高1相当の女子	3回	1回目の接種から6か月の間隔を置いて、1回接種 2か月の間隔を置いて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔を置いて、1回接種



**【問合せ先】**  
高槻市子ども未来部子ども保健課  
(高槻子ども未来館2F)  
〒569-0096  
高槻市八丁畷町12番5号  
TEL: 072-648-3272